



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. Власов

ИНСТРУКЦИЯ

по применению СПЕКТРА КОКСА для лечения и профилактики
кокцидиоза у цыплят-бройлеров и индеек

(организация-производитель: «Spectrum Veterinary Pharmaceutical
Industries Co. Ltd» /«Спектр Ветеринарии Фармасьютикал
Индастрис Ко. Лтд.», Иордания)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Спектра кокс (Spectra coh).
Международное непатентованное наименование: толтразурил.
2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.
Спектра кокс в 1 мл в качестве действующего вещества содержит толтразурил - 25 мг, а в качестве вспомогательных компонентов – глицерол - 50 мг, пропиленгликоль - 400 мг и воду очищенную - до 1 мл.
3. Выпускают препарат в пластиковых флаконах, герметично укупоренных навинчиваемыми крышками.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления.
Спектра кокс запрещается применять по истечении срока годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 4°C до 30°C.
5. Спектра кокс следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности обезвреживают раствором едкой щелочи или водной суспензией гашеной (или хлорной) извести (1:3) и утилизируют в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов. Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

II. Фармакологические свойства

7. Спектра кокс относится к группе антикокцидийных препаратов.
Толтразурил, входящий в состав препарата, является производным триазинона, обладает кокцидиоцидным действием на все стадии внутриклеточного развития (мерогонии и гамогонии) кокцидий, паразитирующих у птиц, в том числе *Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mitis*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria meleagridis*, *Eimeria anceris*, *Eimeria truncata*, включая устойчивые к другим антикокцидийным средствам.

После перорального введения лекарственного препарата толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта. Выводится толтразурил из организма птиц в основном в неизменной форме, а также в виде метаболитов с пометом, у яйценоской птицы также с яйцами.

Спектра кокс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у птиц побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

III. Порядок применения

8. Спектра кокс назначают цыплятам-бройлерам и индейкам при кокцидиозе с лечебно-профилактической целью при появлении у птиц клинических признаков заболевания или при достижении в подстилке критического уровня кокцидий (10-20 тыс./г).

9. Запрещается применение Спектра кокса курам-несушкам, ввиду накопления препарата в яйцах.

10. Спектра кокс применяют птице с водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг массы птицы (28 мл препарата на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:

- 1 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице в течение 48 часов подряд
- или
- 3 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания птиц лечения повторяют через 5 дней.

В период применения Спектра кокса лечебный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для птицы.

Лечебный раствор сохраняет свою активность в течение 48 часов. В случае появления осадка раствор перед применением следует тщательно перемешать.

11. Симптомы передозировки у птиц не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. В случае не соблюдения установленного срока повторного применения препарата при тяжелом течении кокцидиоза его следует применить как можно скорее в той же дозировке по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений у птиц при применении Спектра кокс в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается, противопоказаний не установлено.

15. Спектра кокс совместим с кормовыми добавками, витаминами и другими лекарственными средствами, применяемыми в птицеводстве.

16. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, индеек – не ранее, чем через 16 суток после последнего применения Спектра кокса. В случае вынужденного убоя ранее установленных сроков, мясо птиц может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

17. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Спектра кокса следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

19. При попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его следует смыть обильным количеством проточной воды.

20. Организация-производитель «Spectrum Veterinary Pharmaceutical Industries Co. Ltd.»; Abdullah II Ibn Al-Hussein Industrial City – Sahab, P.O. Box: 185 Amman 11512 Jordan.

Инструкция разработана ООО «АВИС» (г. Москва ул. Николаямская, 55) совместно с компанией «Spectrum Veterinary Pharmaceutical Industries Co. Ltd» (Abdullah II Ibn Al-Hussein Industrial City – Sahab, P.O. Box: 185 Amman 11512 Jordan).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».