



А. Непоклонов

19 НОЯ 2012

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Маннацель+ для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-производитель фирма «Likra Tierernahrung GmbH&Co.KG» / «Ликра Тирэрнерунг ГмбХ унд Ко. КГ», Австрия)

### I. Общие сведения.

1. Маннацель+ (Mannacell+) - кормовая добавка для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. В состав добавки входят: маннан-олигосахариды (МОС) - 40,0%, экстракт клеточных стенок дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* - 40,0%, в качестве носителя - карбонат кальция до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой порошок бежевого цвета, со специфическим запахом дрожжей.

4. Выпускают расфасованным по 20 кг в крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем. Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и торгового знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о соответствии, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке завода-изготовителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 5°C до 30 °C и относительной влажности не более 80 %.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Маннацель+ нельзя использовать по истечении срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Биологические свойства добавки обусловлены входящими в ее состав компонентами. Комплекс глюкоманнанов, полученных из клеточных стенок дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*, способствует улучшению морфологии кишечника и предотвращению фиксации на его стенках патогенных бактерий, тем самым повышая общую резистентность организма, увеличивая сохранность и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

### III. Порядок применения

6. Маннацель+ применяют для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

7. Вводят в премиксы, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых/премиксных заводах и в кормоцехах хозяйств, с использованием существующих технологий многоступенчатого смешивания, из расчета в сутки:

Вид животных	Возрастная группа	Дозировка
Птица	бройлер	1,5 кг/т корма
	Несушка, родители и индюки	1,0 кг/т корма
Свиньи	поросята	2,0 кг/т корма
	свиньи на откорме	1,0 кг/т корма
Крупный рогатый скот	телята	5,0 г/гол/день
	молочные коровы	20,0 г/гол/день

При необходимости рекомендованное количество можно удвоить.

8. Совместим со всеми ингредиентами корма, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

9. При применении Маннацель+ побочных явлений и осложнений не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

11. Продукцию от сельскохозяйственных животных, в т.ч. птиц, после применения Маннацель+ используют в пищевых целях без ограничений.

#### IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Маннацель+ необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана фирмой ООО «Витавет» (г. Москва) совместно с фирмой «ХЕМОФАРМА», Австрия.

Адрес организации-производителя: «Likra Tierernahrung GmbH&Co.KG», Ignaz-Mayer-Straße 12, 4021 Linz, Austria.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-2-32.12/03859