«Утверждаю»
Заместитель генерального директора
по научной работе ООО «АТ Биофарм»
_____ Кузьмин А.А.
«12» _____ 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Салимикс плюс сельскохозяйственным животным и птицам с лечебно-профилактической целью при кокцидиозе

(организация-разработчик ООО «АТ Биофарм», Украина)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Салимикс плюс (Salimix plus).

Международное непатентованное наименование: салиномицин натрий, диклазурил.

2. Лекарственная форма: порошок для перорального применения.

Салимикс плюс в качестве действующих веществ содержит в 100 г салиномицина натрий - 11,0 г, диклазурила - 0,2 г, в качестве вспомогательного вещества - кальция карбонат до 100 г. По внешнему виду Салимикс плюс представляет собой порошок от светло-серого до светло-желтого цвета.

3. Салимикс плюс выпускают расфасованным по 0,1; 1,0 кг в бумажных или комбинированных пакетах и 25 кг в многослойных бумажных мешках. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

4. Салимикс плюс хранят в заводской упаковке производителя, в сухом, темном, недоступном для животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 до 30° С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год с даты производства. Срок хранения Салимикс плюс в смеси с кормом не должен превышать 6 месяцев. Салимикс плюс запрещается применять по истечении срока годности.

5 Салимикс плюс хранят в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Салимикс плюс относится к кокцидиостатикам.

ATCvet QP51, препараты против протозойных инфекций (QP51AH01 салиномицин, QP51AJ03 диклазурил).

Действие препарата Салимикс плюс обусловлены свойствами действующих веществ - салиномицина натрия и диклазурила.

Салиномицин - эймериостатик (кокцидиостатик) группы ионофоров, активен в отношении эймерий *E. tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. mivati, E. maxima, E. brunetti, E. meleagridis, E. meleagrimitis, E. bovis* в стадиях спорозоитов, трофозоитов и шизонтов первой генерации. Механизмом действия салиномицина основан на нарушении транспортировки одновалентных ионов Na^+ и K^+ через мембрану клетки паразита с его последующей гибелью. Салиномицин также активен в отношении грамположительных микроорганизмов, анаэробов и *Serpulina (Treponema) hyodysenteriae*.

Диклазурил - эймериостатик группы триазина, нарушает энергетические обменные процессы эндогенного развития эймерий. Действует на все виды эймерий птиц (*Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella, E. adenoeides, E. gallopavonis, E. meleagrimitis* и т.д.), эймерий кроликов (*E. flavescens, E. intestinalis, E. magna, E. perforans, E. stiedai* и т.д.), крупного рогатого скота, овец, коз и свиней (*E. bovis, E. ellipsoidalis, E. auburnensis, E. zuernii, E. canadensis* и т.д.). Наиболее чувствительны к диклазурилу неполовозрелые формы эндогенного цикла развития эймерий.

При пероральном введении Салимикс плюс плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает свое антикокцидийное действие на слизистой и подслизистой оболочках. Выводится из организма животных и птиц, с фекалиями, главным образом в неизмененном виде в течение 3-4 дней.

Салимикс плюс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Салимикс плюс применяется с лечебно-профилактической целью молодняку кур (цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур) до 12 недель, молодняку крупного рогатого скота и овец (телята и ягнята с развитыми преджелудками), свиньям при кокцидиозе.

9. Запрещается применение Салимикса плюс курам-несушкам в связи с его накоплением в яйцах, телятам и ягнятам с неразвитыми преджелудками, а также лошадям и другим непарнокопытным животным.

10. Салимикс плюс скармливают животным с кормом в течении всего периода откорма в следующих дозах:

- куры (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур) - 500 г препарата на 1 тонну корма (0,5 г препарата на 1 кг корма);

- свиньи до 4 месячного возраста - 250-500 г препарата на 1тонну корма;

- свиньи от 4 до 6 месячного возраста - 250 г препарата на 1 тонну корма;

- молодняк крупного рогатого скота и овцы (от 3-х недель) - 84-250 г препарата на 1 тонну корма.

Для равномерного распределения лекарственного препарата, суточную дозу Салимикса плюс смешивают с небольшим количеством корма (3-10%

общего количества), а затем полученную смесь перемешивают с оставшимся кормом.

Неравномерное смешивание препарата с кормом, неравномерное поедания корма, содержащего препарат (голодные, больные животные), превышение рекомендованных концентраций в корме могут, в отдельных случаях, приводить к снижению продуктивности животных и даже к проявлению клинических признаков отравления.

11. Симптомы отравления при применении лекарственного препарата в рекомендованных дозах не выявлены.

12. Не следует применять препарат животным с повышенной чувствительностью к салиномицину и диклазурилу. Не применять одновременно с другими кокцидиостатиками.

13. Запрещается применение препарата Салимикс плюс одновременно с препаратами, содержащими тиамулин, а также 7 суток до и 7 дней после применения тиамулина.

14. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата, лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

15. При применении Салимикса плюс в соответствии с инструкцией, побочных реакций и осложнений, как правило, не наблюдается.

16. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Салимикс плюс. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Салимикс плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Салимиксом плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку.

19. Упаковку из-под лекарственного препарата утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация - производитель: ООО «АТ Биофарм»; Украина, 61057, г. Харьков, пер. Театральный, 5-1а.

Инструкция разработана ООО «АТ Биофарм»,Украина.
Регистрационное удостоверение выдано ООО «АТ Биофарм», Украина.

Зарегистрирован Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан 12 июня 2013 г. Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-2365-13.