

2020

Название

лекарственная форма
действующие вещества (% или в 1г/1мл препарата)

ПОКАЗАНИЯ

ДОЗА

ПРИМЕНЕНИЕ

Антибактериальные препараты

ТимТил-250®

оральный раствор

тиамулина фуемарат - 14,5%
тилозина тартрат - 10,5%



заболевания ЖКТ и органов дыхания (бронхит, микоплазмоз, эшерихиоз, пастереллез и т. п.)

1 мл
на 1 литр воды

С водой,
курс 3-5 дней

заболевания ЖКТ и органов дыхания (рожа, дизентерия, илеит, лептоспироз, листериоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и т. п.)

0,8 мл на 10 кг
массы тела

С водой,
курс 3-5 дней

ТимТил

раствор для инъекций

тиамулина
гидроген фуемарат - 8,75%
тилозина тартрат - 6,25%



бронхопневмония, дизентерия, перитонит, метрит, пупочный сепсис, гнойный артрит, копытная гниль, бруцеллез, лептоспироз, послеродовые осложнения, послеоперационные инфекции

Всем видам животных внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела, один раз в сутки в течение 3-5 суток

Спектра Флор - 10

оральный раствор

в 1 мл флорфеникол 100 мг



болезни бактериальной этиологии

300 мл препарата
на 100 л воды

С водой в течение 3-х дней

Спектра Кол

порошок для орального применения

в 1 г колистина сульфат 6 000 000 ME



болезни бактериальной этиологии

0,5 г на 10 л
воды

С водой,
курс 3-5 дней

1,0 г на 100 л
воды

С водой,
курс 3-5 дней

Спектра Тил

оральный раствор

тилмикозина фосфат 250 мг/мл



болезни бактериальной этиологии

30 мл препарата
на 100 л воды

С водой,
курс 3 дня

80 мл препарата
на 100 л воды

С водой,
курс 5 дней

Бровафом новый

порошок

колистина сульфат 25,0 мг (500000 ME)
окситетрациклин 35,0 мг
триметоприм 90,0 мг



микоплазмоз, коллибактериоз, пастереллез, заболевания органов дыхания, дизентерия, сальмонеллез

1 г на литр или
1,5-2 кг / 1т корма

С питьевой водой или кормом в течение 3-5 дней

энтериты, заболевания органов дыхания

0,5 г на 10 кг
массы тела

Перорально, 2 раза в день,
курс 5-7 дней

энтериты, заболевания органов дыхания

1-1,5 г
на литр

С питьевой водой в течение 3-5 дней

Цефтиокур 4 г

порошок для инъекций

цефтиофура натрия соль - 100%



предупреждение ранней смертности (однодневные индюшата и цыплята)

0,08-0,2 мг
на голову
0,2-0,5 мг
на голову

Подкожно, однократно

Цефтиоклин

суспензия для инъекций

цефтиофура гидрохлорид - 5%



послеродовой эндометрит,
некробактериоз,
заболевания органов дыхания

1 мл на 16 кг
массы тела

Внутримышечно,
1 раз в сутки, курс 3-4 дня

Трифлон

оральный раствор

энрофлоксацин 10%,
триметоприм 5%



бактериальные
и микоплазменные
инфекции

1 мл на 50 кг
массы тела

Подкожно или внутримышечно,
1 раз в сутки, курс 3-5 дней

Оксипрол

раствор для инъекций

в 1 мл: окситетрациклина
дигидрат 200 мг



грамположительные
и грамотрицательные бактерии,
простейшие, микоплазма,
риккетсии, хламиди,
чувствительные
к окситетрациклину

1 мл
на 10 кг массы тела

внутримышечно
однократно

0,25 мл
на 1 кг массы тела

внутримышечно
однократно

Сарофлокс

порошок для перорального
применения

в 1 г: сарофлоксацина
гидрохлорид 100 мг



колибактериоз, сальмонеллез,
некр. энтерит, септицемия,
стафилококкоз, стрептококкоз,
микоплазмоз, гемофилез, пастереллез,
заболевания органов дыхания,
ЖКТ, мочеполовой системы,
вторичные бактериальные инфекции
при вирусных заболеваниях

25 г
на 100 л воды

С водой,
курс 3 дня

Бровасептол концентрат

порошок для перорального
применения

в 1 г: сульфадиметоксина
натриевая соль 300 мг,
сульфадиазина
натриевая соль 300 мг,
триметоприм 120 мг



комплексный бактерицидный,
бактериостатический препарат
широкого спектра действия

0,3 - 0,35 г
на 10 кг массы тела

С водой или кормом
1-2 раза в сутки;
4-6 дней

1 г на 3 л воды

С водой,
1-2 раза в сутки;
4-6 дней

Бровасептол порошок

порошок для перорального
применения

в 1 г: сульфатазиола натрия 80 мг,
сульфагунидин 70 мг,
триметоприм 30 мг, окситетраци-
клина гидрохлорид 45 мг,
тилозина тартрат 25 мг



комплексный бактерицидный,
бактериостатический препарат
широкого спектра действия

1 - 1,2 г
на 10 кг массы тела

С кормом
3-6 дней

Бровасептол таблетки

таблетки для перорального
применения

В 1 г (1 таблетка):
сульфатазиола натрия 80 мг,
сульфагунидин 70 мг,
триметоприм 30 мг,
окситетрациклина гидрохлорид 45 мг,
тилозина тартрат 25 мг



комплексный бактерицидный,
бактериостатический препарат
широкого спектра действия

1 - 1,5 г
на 10 кг массы тела


С кормом
4-5 дней

Кокцидиостатики

Мадуро Форте

нерастворимый в воде порошок

мадурамицин аммония – 9 мг;
диклазурил – 2 мг;



профилактика и лечение эймериозов (кокцидиозов)


0,5 г препарата на 1 кг корма (500 г на 1 т)

Тщательно перемешивают сначала с небольшой частью корма (3-10% общего количества), а затем с остальным кормом.

Салимикс Плюс

нерастворимый в воде порошок

салиномицин натрия – 110 мг;
диклазурил – 2 мг;



профилактика и лечение эймериозов (кокцидиозов)

500 г препарата на 1 т корма
250-500 г/1 т в возрасте до 4 мес.,
250 г/1 т до 6 мес.
84-250 г препарата на 1 т корма

Тщательно перемешивают сначала с небольшой частью корма (3-10% общего количества), а затем с остальным кормом.

Соликок

оральный раствор

диклазурил – 2,5 мг



лечение эймериозов (кокцидиозов)

2 мл на 1 л питьевой воды

Курс 2 дня

Спектра Кок

оральный раствор

в 1 мл содержит толтразурил 25 мг



профилактика и лечение эймериозов (кокцидиозов) у цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур, уток, гусей, индеек

1 мл на 1 л питьевой воды


В течение 48 часов

Противовоспалительные препараты

Кефен

раствор для инъекций

кетопрофен -10%



острое или хроническое течение воспалительных процессов

0,3 мл препарата на 10 кг массы тела

В/м и в/в 1 раз в сутки в течение 1-3 суток

1 мл препарата на 45 кг массы тела

В/м 1 раз в сутки в течение 3-5 суток

Пробиотики и пребиотики

Эмпробио

оральный раствор

состоит из живых не спорообразующих культур микроорганизмов *Lactobacillus casei*, *Lactococcus lactis*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Saccharomyces cerevisiae* и продуктов их метаболизма



профилактика и лечение желудочно-кишечных заболеваний, стабилизации микрофлоры кишечника, улучшения процесса пищеварения

Молодняку кур и индеек возрастом до 20 дней – 1,0 л /тону воды, ремонтному молодняку и взрослой птице – 0,5 л /тону воды в течение 14 дней.

Молодняку КРС в возрасте до 3 мес. 20-30 мл на голову/сутки, в возрасте от 3 -6 мес. – 30-50 мл на голову/сутки.

Новорожденным пороссятам - 0,5 мл на каждое вскармливание в течение 14 дней.
Пороссятам 14-28 дней – по 1-1,5 мл на голову/сутки.
Пороссятам на отъеме в возрасте 28-60 дней 1,5-2,0 мл на голову/сутки.
Пороссятам 60-90 дней 1,5-2,5 мл на голову/сутки.
Свиньям более 90 дней 1,5-2,5 мл на голову/сутки.

Маннацель+

порошок

МОС-40%;
экстракт дрожжевой культуры *Saccharomyces cerevisiae* - 40%



добавка для повышения сохранности и продуктивности


Вводят в премиксы, комбикорма для поросят 2,0 кг/т корма, свиной на откорме 1,0 кг/т корма, для телят 5,0 г/гол/день, для молочных коров 20,0 г/гол/день; для бройлеров 1,5 кг/т корма, для несушек, родителей и индюков 1,0 кг/т корма.

Антигельминтные средства

Бровермектин 2% водорастворимый

раствор

ивермектин - 2%



гельминтозы животных и птиц


1 мл на 50 кг массы тела

Однократно, при акарозах повторить через 7-10 дней

Бровермектин 1%

раствор для инъекций

ивермектин - 1%



Лечение и профилактика животных при поражении эндо- и эктопаразитами

0,2 мл на 10 кг массы тела

Однократно, при акарозах повторить через 7-10 дней

0,3 мл на 10 кг массы тела

Однократно, при акарозах повторить через 7-10 дней

0,2 - 0,4 мл на 10 кг массы тела

Однократно, при акарозах повторить через 7-10 дней

0,1 мл на голову

Однократно, при акарозах повторить через 7-10 дней

Бровермектин гель

гель для перорального применения

В 1 мл препарата 4,0 мг ивермектина



Лечение и профилактика лошадей при заболеваниях вызванных нематодами

1 мл на 20 кг массы тела

Однократно

Бровальзен-250 таблетки

таблетки для перорального применения

В 1 г: альбендазола 250 мг



Поражение половозрелыми нематодами и личинками ЖКТ и легких

0,3 — 1 г на 10 кг массы тела

Однократно

Бровадазол гель

гель для перорального применения

В 1 мл препарата 150 мг фенбендазола



лечение и профилактика лошадей при заболеваниях вызванных нематодами

1 мл на 20 кг массы тела

Однократно

Брванол плюс

таблетки для перорального применения

В 1 г (1 таблетке) препарата содержится 50 мг празиквантела, 2 мг ивермектина; 38 мг левамизола гидрохлорида



лечение и профилактика собак при поражении блохами, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами, личинками и половозрелыми нематодами, цестодами и некоторыми трематодами

Одна таблетка на 10 кг массы тела


Однократно

Инсектоакарициды

Эктосан

эмульсия для наружного применения

В 1 мл препарата содержится 85 мг альфаметрина, 115 мг пиперонила бутоксида



лечение и профилактика животных и птицы при поражении эктопаразитами (клещами, вшами, власоедами, пухоедами, кровососущими насекомыми, личинками мясных мух, подкожного и овечьего овода)

Раствор для дезакаризации 1:500, для дезинсекции 1:50, клещи 1:750, эктопаразиты других видов 1:1000
Однократно

Цифлур

раствор 1% для наружного применения

В 1 мл 10 мг цифлутрина



защита крс в пастбищный период

5 мл на 1 животное

Однократно



защита собак в период активности эктопаразитов

1 мл на 10 кг массы тела

Однократно

Витаминные комплексы и гепатопротекторы

Карнивит

раствор

В 1 л препарата содержится:

Магний (Mg) 1800-2200 мг/л;

Витамин B12 27-33 мг/л;

L-карнитин 27000-33000 мг/л;

DL-метионин гидроксид аналог
13500-16500 мг/л;

Натрия гидроксид 4500-5500 мг/л;

Витамин B3 (никотинамид)

13500-16500 мг/л;

Бетаин 27000-33000 мг/л;

Витамин B6 4500-5500 мг/л;

Холин хлорид 108-132 г/л.



Для повышения сохранности и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

0,25 мл на 1 л воды

Курс 3-5 дней

2 мл на 10 кг
живой массы в сутки

Курс 3-5 дней

10 мл на 100 кг
живой массы в сутки

Курс 3-5 дней

Брио Эггшелл

порошок

В 1 кг препарата содержится:

Витамина B2 1000 мг; Витамина B5 1000 мг;

Витамина B6 2000 мг; Витамина B12 10 мг;

Витамина PP 5000 мг; марганца 10000 мг;

бутират кальция 15%; карбонат кальция 85% до 1 кг.



для увеличения продуктивности кур-несушек и повышения прочности скорлупы яиц

0,2% от массы корма

Оптивит В +

порошок водорастворимый

В 1 кг содержит не менее:

витамина B1 8800 мг; витамина B2 5500 мг;

витамина B6 5800 мг; витамина B12 11000 мкг;

витамина C 22000 мг; витамина K3 – 3000 мг;

никотиновой кислоты – 18000 мг;

пантотеновой кислоты – 20000 мг;

фолиевой кислоты – 300000 мкг;

биотина – 100000 мкг



кормовая добавка для балансирования и обогащения витаминами рационов птицы

0,5-1 г на 1 л воды
в сутки
или

1-2 г на 1 кг корма
в сутки

Курс 3-7 дней

Фос-Бевит

раствор для инъекций

В 1 мл бифосфана 100 мг,

никотинамида 5 мг,

фолиевой кислоты 1,5 мг,

цианокобаламина 0,05 мг



+ пушные звери

при нарушениях обмена веществ, недостатке витаминов, как стимулирующее и тонизирующее средство для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии.

0,1-1,5 мл
на 10 кг массы тела

1 раз в сутки
4-5 дней

Препараты для лечения репродуктивных органов

Броэстрофан

раствор для инъекций

клопростенола натриевая соль - 0,025%



усиление потуг при осложненных родах, ускорение инволюции матки, задержание последа, терапия метритов в комбинации с противомикробными средствами, регрессия персистентного желтого тела и кисты желтого тела, стимуляция и синхронизация эструса в период осеменения

2 мл на 400 кг
(на каждые + 50 кг
добавить 0,3 мл)


внутримышечно,
однократно

Нейтрализаторы микотоксинов

Кормо-токс Плюс

порошок

алюмосиликат натрия - 85%;
каолинит - 7%;
экстракт дрожжевой культуры
Saccharomyces cerevisiae - 8%.



добавка для адсорбции
афлатоксина В1,
охратоксина А,
зеараленона, Т-2 токсина
в кормах

1-2 кг/ 1 т корма

20-80 г на голову в сутки

Противомаститные препараты

Бровамаст 1Д

суспензия

В 10 мл: клоксациллина
натриевая соль - 300 мг,
неомицина сульфата - 150 мг,
преднизолона - 10 мг



серозный, катаральный,
фибринозный, гнойный,
субклинический мастит
(дойные коровы)

10 мл в каждую
долю вымени

Интрацистернально,
курс 2-3 дня

Разные ветеринарные препараты

Ранойод

порошок для наружного
применения

1 г содержит 40 мг йодоформа,
50 мг сульфатуанидина,
10 мг триметоприма



фолликулит, дерматит, экзема,
инфицированные раны,
маокурые экземы, трофические
язвы, воспаления, абсцессы,
фибромы, фурункулы,
флегмоны и тд.

обработка
пораженного места
и 2-3 см вокруг него

1 раз в сутки

Цифлодекс

суспензия, глазные
и ушные капли

В 1 мл 4,5 мг ципрофлоксацина
гидрохлорид,
1 мг дексаметазона
натрия фосфат



+ мелкие
экзотические
и декоративные
животные

лечение собак, кошек, мелких
экзотических и декоративных
животных при острых
и хронических воспалениях
глаз и ушей

в конъюнктивальный мешок 1-2 капли
каждые 2-3 часа;
в слуховой проход 1-4 капли 2-3 раза в сутки.
Курс 1-2 дня.